

N^o. 164. Sur l'analogie et le caractère
de certains virus.



Le terme de virus a beaucoup d'acceptions différentes, mais strictement pris il doit signifier une infection des humeurs susceptibles de se perpétuer et de se propager. Les maladies par conséquent qui ont ce caractère, méritent le surnom d'virulentes.

Tous nos sucs depuis les matières alimentaires jus qu'aux liqueurs secrètes et aux excréments, sont susceptibles d'altération qu'on peut réduire à deux classes générales, celles qui se font selon les lois et la vue de la nature, et celles qui se font contre l'ordre naturel établi dans l'économie animale.

Les altérations de la première classe produisent toutes les humeurs naturelles, celles de la seconde produisent au contraire tous les sucs contre nature, qui par l'excès de certains de leurs principes, ne sont plus propres à remplir les usages aux quels ils étoient destinés. C'est cette dernière classe d'altération qu'on appelle communément dépravation.

on peut en considérer de deux espèces, savoir celle qui se fait spontanément dans nos humeurs — soit par le vice soit par le défaut d'action dans nos organes, et celle dont le principe est apporté du dehors; cette seconde espèce est l'infection elle consiste dans l'introduction de substances nuisibles qui sont les poisons, et tous les principes contagieux

(21)
Le caractère commun à toutes les maladies
virulentes est le plus ou le moins de contagion, en
de ne pouvoir finir que par la destruction du principe
même, ou par l'épuisement des matières qui lui servent
d'aliment.

Le caractère particulier de chacune de ces mala-
dies tient à la nature de l'humeur qui lui est propre
puis que leurs progrès & leurs symptômes, ou plus ou
moins d'activité ^{qui} forment l'humeur, ou parviennent à
le siège du virus est plus ou moins foudroyant.

on pourroit distinguer les virus en actifs
Mands ou sanguins, et en lents, froids, ou lymphatiques.

Ceux de la première classe sont caractérisés
par leur activité & la fièvre qui les accompagne
tout jour & qui leur est essentielle. par leur durée
qui est courte & qui s'termine toujours dans un
espace de temps précis, par une éruption, quand la
mort n'est la première venue.

Ceux de la seconde sont distingués par la
lenteur dans la contagion les progrès & la terminaison
il n'y a point de fièvre qui leur soit essentielle
ils ne s'terminent ordinairement point par des crises
mais ils continuent toute la vie si on en laisse
subsister le principe.

Le virus cependant agit spécialement sur
le sang sans participation du caractère inflammatoire
de ce liquide, mais comme il parvient en même
temps agir aussi sur la lymphe, on pourroit le
regarder comme mixte.

Observations et expériences
sur la nature et la dépravation des
humeurs animales, pour servir de
préliminaires aux observations sur
les maladies virulentes.



Le sang en sortant de la veine ne ~~présente~~
donne aucune marque ni d'acidité ni
d'alcalinité, non plus que la serosité.

La salive d'un homme en santé en prise
à jeun, ne rougit que très peu le papier bleu
rouge avec le tournesol, et devient un peu blanc
qui est coloré avec la fleur de violette. Si
le sujet a mangé elle devient moins la teinte
de violette et rougit davantage celle de
tournesol, ceci dépend encore de la qualité
des aliments.

La salive d'un homme qui a une fièvre
humorale avec la langue blanche et chargée
d'une soif considérable et beaucoup
d'écume dans la bouche devient peu la
teinte de violette et rougit beaucoup celle
de tournesol.

La salive dans l'état naturel rougit
fortement le papier bleu, il en est de même
en maladie excepté dans celles du putrefaction
et encore il est clair qu'elle plus fétide, même
ne le rougit pas.

Si on mouille la peau avec de l'eau, et qu'en suite on applique du papier bleu, la drappe qui a été détrempée le rouge beaucoup, mais celle des mains et des pieds le rouge plus fortement qu'ailleurs.

Lors que dans un cadavre on a levé l'épiderme le corps uniquement découvert rouge plus ou moins. Le papier bleu faisant les sujets.

Si on laisse pourrir un cadavre jusqu'à ce que l'épiderme se détache, on trouve le corps uniquement couvert d'une maille fétide qui fuit de ses porosités. Cette maille ne fait aucune impression sur la couleur de tournesol, mais elle verdit celle de violette.

L'urine d'un homme sain rend le papier en fortant d'urine, rouge la teinture de tournesol plus fortement que la salive, et verdit celle de violette, mais si on expose à l'air la teinture de violette verdit par l'urine, peu de temps après elle devient rouge.

Le sile qui se trouve dans la capsule du fiel verdit la teinture de violette et rougit celle de tournesol.

Les matières alimentaires, contenues dans l'estomac rougissent plus ou moins la teinture de tournesol suivant les aliments qu'on a pris, et verdissent très peu et quelquefois même de tout celle de violette.

Lors qu'il n'y a point d'aliments dans l'estomac, le papier qui s'y rencontre rouge moins le tournesol, que ne font les matières alimentaires, mais verdit davantage la teinture de violette.

Les matières alimentaires dans les intestins grâces, verdissent davantage la teinture de violette et rougissent moins le tournesol que celles de l'estomac.

(3)

Les matières florissantes dans les gros intestins
rougissent la teinture de tournefort, mais verdissent
davantage celle de violettes.

Le suc ~~de~~ la graisse dans son état naturel ne produit
aucun changement dans la couleur de tournefort ni dans
celle de violettes.

Les saucs que j'ai rencontrés dans les hydopies de
poitrine ~~ont~~ presque toujours rougi la teinture de
tournefort; celles du bas ventre le rougissent moins.
Ceci varie néanmoins suivant le degré que les saucs
avoient faits dans les capacités.

Je suis sûr que qu'il avoit plus ou moins occupé
verdissent ou rougissent les teintures blanches des végétaux,
et j'ai remarqué à peu près les mêmes variations dans
les dépôts et les ulcères, comme on verra que j'ai
observé dans les différentes expériences que j'ai fait
sur la putrefaction, ainsi que sur celle de la



(6)
Des perieres sur la putrefaction du sang
et de l'lympe . . . |

Le 1.^{er} juillet 1772 j'ai fait bouillir de la
protite de sang pour en separer la partie albumineuse
le tout s'est reduit en une coagulum blanc assez ferme
a l'exception d'environ deux gros de l'aqueux
et blanc. j'avois expose au feu manchepied de
protite.

j'ay separé cette portion aqueuse, elle
devenoit plus laiteuse de traverser un papier elle
verdissoit celle de rivette. j'y la mis dans un
petit flacon que j'y bouchai bien, dans l'espace
de quinze jours elle devint fortifiée et il s'en
forma un petit peloton blanc dans le
fond du flacon.

Le 19 juillet j'ai mis quatre onces de protite dans
une phiole de verre que j'exposai au soleil apres
l'avoir bouchée.

Le 22 j'apparem dans le fond d'un vase un leges
de protite lacteus, et l'odeur étoit devenue fortifiée.

Le 24. le depot étoit un peu augmenté, et
l'odeur étoit plus forte.

Le 27. il étoit haut de quatre a cinq lignes (1)
et l'odeur étoit un peu fortifiée que les jours precedens.

230 le dépôt avait été remanié, et le
tout sentait une odeur d'huile et de graisse. L'écoulement
en rouge latente et tourmenté, le sang était
devenu blanc et laur de chair.

Le 4 août, le sang était, un peu éclairci
siens verdâtre, le sang était toujours fatigué
par un peu de pénétration, et sentait encore plus
l'écoulement qu'un peu précédent. Le dépôt
était un peu augmenté. Le tout était plus
fortement le papier bleu, mais le bled était
lequel le sang ou le sang était. Le sang
7. Le sang était un peu augmenté.

Dans le sang de la nuit qui était sorti d'un
kidney qui avait été depuis longtemps en
sueur, j'en ai vu un peu de papier bleu qui était
au bout du sang.

4.



Dans le sang de la nuit j'ai vu une chose de
brutité du sang qui était au bout pendant
quatre jours. Dans un bled de la nuit, au bout
de la nuit elle avait été fortement latente de la nuit
sans attente de la nuit, et avait été un peu
fatigué et pénétré. Le sang était un peu augmenté
et elle avait été fortement latente, elle avait été
la nuit de la nuit, elle avait été la nuit de la nuit
et elle avait été la nuit de la nuit. Le sang était un peu
augmenté et elle avait été la nuit de la nuit. Le sang
était un peu augmenté et elle avait été la nuit de la nuit.

a legard de la couleur des membranes, celle des
 aortes verdie presque toujours la teinte de
 violette une fois pour deux fois plus de
 tournesol, mais celle des membranes de poitrine
 la rougeur quelquefois

ou les coagulum de la chaux de la
 bœillante elle produisant après les mêmes
 effets que la ferretite du sang coagulé que
 le coagulum est moins uniforme et plus granuleux
 qu'il est plus long et plus formé et qu'il a
 l'aspect d'un coagulum de coagule pour

Le 6 juillet j'ai ouvert le cadavre d'un homme
 âgé de 70 ans mort d'un catarrhe suffocant dans
 l'espace de trois jours. Tous les pharynx les larynx
 et la membrane interne de la trachée artère
 étaient enflammés, les poumons étaient livides
 gorgés de sang, et il parait qu'il avait une éruption
 dans les bronches dans chaque lobe de la poitrine
 la fosse était dans le même état.

Les sangs de la poitrine rougissaient la
 teinte de tournesol, et verdissaient très peu
 celle de violette. J'en pris des portions
 une ferretite sanguinolente qui rougit
 aussi le papier bleu. Je l'exposai sur le
 feu, mais il ne fallut un degré de chaleur
 plus fort que pour coaguler la ferretite du
 sang, et elle fourmilla plus de liquides après.

Le coagulum étoit plus brun, granuleux et un peu mou. Le coagulum étoit aussi que la partie supérieure verdâtre un peu latente de violettes et rouge plus beaucoup celle de tournesol
Je mis dans une bouteille une portion de ce sang
sorti des veines au bout de quatre jours il étoit
fétide et noir, il seroit beaucoup latente de violettes
et de rouge plus celle de tournesol.

Le 18 juillet, j'ai trouvé dans deux fétides
notes pénétrantes. L'air étoit si épais, il
étoit beaucoup écumé, et le coagulum en fait
venant la coagulation il étoit beaucoup d'air
avec sifflement. Le coagulum formé un peu plus
que la moitié de volume. Cette un peu de coagulum
un sang et un si la fétide ne donneroit de marquer
d'acidité, mais dans fermenter avec les acides.

Dans cette expérience, il paroit qu'acide
trouve. D'abord dans les sacs de la poitrine et dans le
sang brun qui engorge les veines et le sel
naturel des végétaux qui n'avoit pas encore été
changé par l'action trop faible de l'air et de
la chaleur. Les fétides ont pu changer de forme
par l'effet de la poitrine et ont disparu.

On voit dans cette expérience et encore mieux dans
la précédente, la gradation de l'effet de la poitrine sur
le sang en la poitrine, qui écumé, le coagulum plus
lentement et se venant beaucoup d'air avec sifflement
quand il a subi un certain degré de putréfaction.
C'est aussi le degré de putréfaction qui en attire une
portion au point de lui faire perdre entièrement la propriété
de se coaguler au feu.



on a vu dans la précédente que la fin l'alcali
 volatils forme par la première putrefaction,
 de paraison venant dans la seconde, et en
 la fin plus voir à la fin qu'un acide qui
 domine, c'est ce que les suivantes nous feront
 encore voir plus clairement.

Le 10 juillet j'ai ouvert le cadavre d'un
 herbivore qui avoit eu la peste pour les trois
 dernières vaches de l'école d'Orléans, le sang étoit
 coagulé, et il y avoit dans la poitrine beaucoup
 de sang rougeâtre qui rougissoient au peu la
 teinture de tournesol, sans qu'il y eût la
 communication de la couleur.

Le bas ventre étoit rempli de beaucoup
 de sang, assez clair qui rougissoient davantage la
 tournesol que les précédentes. Le bras gauche étoit
 cadavérique, j'y fis quelques scarifications, d'où il
 sortit une petite qui rougit aussi le papier bleu
 même que celles du bas ventre et plus que celles de
 la poitrine. Le sang contenu dans les artères
 herbivores et la fin de sang rougeâtre que j'y trouvois
 dans les artères ne rougit point le papier
 bleu, mais verdit la teinture de violettes; le sang
 que j'exprimai de nouveau rougit le papier
 bleu.

J'y trouvois le thorax plein de boisson et
 d'huile qu'il avoit prise. qui teignoit d'un
 rouge vif le papier bleu. De même que les
 matières contenues dans les intestins grêles qui étoient
 gris et muqueux, celles des gros intestins étoient
 jaunâtres et avoient les mêmes propriétés
 au bout de trois jours. C'est-à-dire le 13 j'ai
 fait bouillir une portion de toutes les eaux, il s'en

(16) 147
et avais vu que si l'on a tenu
dans le feu au fort quelle, ou au bouillon, quand le butin
l'est fait elle se gonfle avec des plis les
vaisseaux. il l'est formé une ~~seconde~~ blanche et
épaisse qui l'est dure. on peut voir faire
environ le quart de la liqueur, la tête est un
serum laiteux qui est par coagulable, et qui
a une odeur forte de melle saigre, des matières
rougeâtres beaucoup moins le papier blanc quelle
n'avoient fait auparavant.

Le 16 j'ai séparé le coagulum dans toutes
les liqueurs. J'ai vu le serum, et afin de les
exposer à la pouture dans des vaisseaux différents.
et j'ai gardé dans une phiole un peu de sang de
boeuf qui n'avoient point été exposés au
feu, et j'exposai toutes ces substances au soleil
dans des vaisseaux bouchés.

Le 17 elle avoit la même odeur forte que
la jours précédents, et elle rougissait le papier
blanc noir. Celle qui étoit point bouillie le
rougissait aussi, et toutes ces liqueurs
étaient plus marquées que la veille, on voyoit dans le fond
de toutes les phioles un commencement de dépôt
blanc, et à la surface une pellicule jaunâtre
et blancheâtre.

Le 18 les choses étoient à peu près dans le
même état excepté que les phioles dans les deux
phioles étoient plus corrodées. Le coagulum
qui s'étoit formé dans le butin avoit acquis la
même odeur il étoit devenu semblable à
ferme par, et rougissait le papier blanc.



je le mêlai avec son même poids d'eau.

Le 14 au soir j'ai mêlé la partie aqueuse que j'avais séparée de coagulum par l'ebullition, avec du vinaigre, il ne s'est point fait de fermentation apparente mais l'huile emulsiueuse qui étoit contenue dans ma part s'est unie avec le vinaigre une large pellicule à la surface, & la liqueur devint laiteuse. J'en mêlai une autre portion avec l'alcali fixe du fond, qui ne produisit aucun effet.

Il s'écoula encore faiblement le tourmesol mais verdissait beaucoup la teinture de violettes.

Après avoir mis du papier blanc avec du vinaigre & le trempé dans le même serum, aussitôt la couleur rouge disparut, le papier devenant bleu.

Après une évaporation dans celui qui n'avait point souffert l'ebullition, il produisit le même effet que dans le premier, à l'exception qu'il ne se rendit pas si laiteux. Ce serum s'écoula davantage le papier bleu que celui dont j'avais séparé le coagulum par la même évaporation.

Le 21. mes deux liqueurs avaient une odeur forte & pénétrante & tirant plus sur l'aigre que les jours précédents, mais celle dont j'avais séparé la partie coagulable avait une odeur plus pénétrante que l'autre; j'avais séparé la vaille de dépôt blanc qui s'étoient formés dans le fond de chaque vase. Celui des serum qui avait souffert l'ebullition étoit gris & granuleux & plus considérable que celui de l'autre qui étoit blanc & uniforme comme du papier, toutes ces teintures s'écoulaient un peu le tourmesol mais verdissait beaucoup la teinture de violettes.

J'ai exposé séparément toutes ces matières au feu. Le dépôt de fer qui avoit souffert le plus de la putréfaction, et qui étoit devenu le plus coagulable; aussitôt un peu, il s'est formé une drasse qui formoit à la surface, une liqueur et une partie qui devoit s'élever, et une sédimente qui se réunissoient au fond du vase.

Le dépôt de peraillement étoit devenu une masse blanche mais plus considérable, qui a formé un coagulum semblable au fromage blanc dans son bouillonnement, et il s'est formé une liqueur claire qui étoit plus coagulable au feu.

À l'égard des liqueurs, dont les dépôts avoient été tirés, je les ai fait bouillir et réduire à moitié. Celle dont j'avois déjà extrait la partie coagulable par un feu modéré, devenue moins visqueuse et coagulable, et il s'est formé dans le fond un peu de sédimente granuleux qui se ressembloit à celui que j'en avois déjà tiré.

Il s'est formé à la surface de celle qui n'avoit point bouilli, beaucoup de sédimente, en fait un coagulum blanc qui pouvoit faire environ le quart de la matière.

Toutes ces matières, après la putréfaction ont perdu leur odeur fétide et pénétrante, et ont contracté le doux d'après la laie. Elles ne firent plus aucune impression sur la teinture de mauvelette. Mais, lorsqu'on fortifia celle de l'ourme.

Le coagulum que j'avois laissé exposé à la putréfaction avec de l'eau, devint semblable à



de fromage blanc qu'on a vuie mis dans l'eau
bouillante, et il s'engrippe fortement le
papier bleu.

Cette dernière expérience vient à l'appui
de ce qui a été démontré dans les précédentes,
et il en résulte encore, que la lymphhe en ^{quelques}
longtemps à la putrefaction est susceptible de ~~former~~
à plusieurs degrés des acides, et des alkalis volatils,
et second lieu que l'abrutition qu'on fait subir
à des matières corrompues à la fin de leur putrefaction
est dans le cas en évaporer les alkalis volatils
et rendre sensibles les acides qui s'y rencontrent
tous jours. Intérieurement lieu, que le dépôt blanc
qui se forme au fond des vases dans la première
putrefaction n'est pas une raison démontrative
que le pus auquel il se semble s'en former.
C'est pourquoi par la partie albumineuse
la lymphhe qui se trouve dans la cavité d'un
ulcère ou d'un abcès, puis qu'on voit qu'elle
se putrifie qui est prise de la partie albumineuse
au moyen de la chaleur à produire le même dépôt
que celle qui n'en avoit point été prise -
à l'exception qu'il étoit moins blanc et moins
uniforme, le dépôt paroit être plutôt la
partie de la lymphhe la plus chargée de terre et
d'acide.

On voit aussi dans l'ouverture du cadavre qui
est fort putride, que le sang des eschimes et celui
qui s'écoule de la plaie, n'ont pas de la même
du corps, et la limon étoient les seules matières
ou l'acide ne se manifestoit point. Il est
probable que celui que les liqueurs avoient
eu une plus grande élaboration que les autres,
qui avoient échappé jusqu'à la faiblesse de
l'organe.

Le 10 août j'ai vu un cadavre de femme qui étoit
époussée dans le jardin, j'ai trouvé en sa poitrine
qui étoit ouverte par une blessure. j'en ai pris une portion
que j'ai rapportée dans l'établissement de la ville. Dans
les bouteilles, l'altération de couleur par laquelle
les os blancs du bras se sont fait. j'ai vu les os de la
cuisse et j'en ai pris une portion. j'observerai
les phénomènes qui se passent dans les os de la
main.

9.

Sur la fin de l'hiver 1772 un homme a la suite d'une
pluie fine une fièvre puerile d'oppression, pour laquelle
on lui fit l'opération de la trachée. Il en sortit une
eau jaunâtre qui s'élevait la tête. Le lendemain
on ne faisait plus de rien. On lui fit une saignée de
la tête, elle devint un peu fraîche; les autres
se firent un peu de la tête et de la poitrine, et on
lui fit saignée. au bout de trois jours après
l'opération des saignées faites, plus rouge et plus fraîche
allors elle s'élevait mieux le lendemain, et vendit
la violette. Le 12^e jour elle étoit trouble, et de
fort mauvais venant, les parties convalescentes se
dégrossaient, alors elle se débarrassait de la tête
de la violette et ne faisait aucun effort sur la tête du
lendemain.

Cette observation fournit un exemple possible
des degrés de dépravation des liquides. aussi dans
du corps, ~~avec~~ semblable à ceux que nous avons
observés au de hors.

5).
nous avons vu aussi, par les dissections que les
causes des hydrocèles de la petite du large sont à
peu près de la même nature excepté que l'écoulement
est ordinairement plus manifeste, & que les parties
susceptibles de s'engorger en font ~~un~~ ^{un} ~~plus~~ ^{moins}
abondante dans les premiers que dans les autres.
nous allons voir de même dans la suite
suivante, que l'adiposité s'oppose à la formation
de ces malades présente quelquefois
par les causes & le traitement.

au mois de mars 1772 j'ai pris une pinte de suc
de plusieurs galliens; il m'en donna six ou sept
ou dix. Je l'ai pris.

J'ai plus aimé la censure que l'éloge
 d'un homme faux, qui méfioit mieux de la vérité
 que d'un fol seigneur, de cette noble extravagance.

[illegible]

Le 22 juillet j'ai pris de la peau de pied
d'un cadavre. De laquelle j'ai fait la graisse. En j'ai mis
cette peau à cette graisse. Surtout dans des
vaisseaux bien bouchés avec lesquels j'ai mis
pour les faire macérer.

Le 24 Leau dans laquelle j'ai mis la peau
en macération devient rougeâtre et se forme de
la même à la surface.

Le 27. Il s'est fait dans la bouteille qui la contenait
une explosion qui emporta le bouchon, il se
répandit une certaine quantité de eau, et j'ai trouvé
le sol de la bouteille recouvert d'une matière blanche
semblable à du suif. Cette matière ne s'étendait
qu'à la surface, et se couvrait d'un rouge vif
le papier bleu au dessous. Leau ~~de la bouteille~~ avait
une odeur très forte et se couvrait aussi d'un
légerement la même vapeur.
J'ai séparé leau et l'ai mis seul dans une
bouteille.

Dans les vaisseaux où j'avais mis la graisse il
s'est formé à la surface de l'eau une croûte grasse
jaune, qui se couvrait fortement le papier bleu.
aussi que leau dans laquelle elle se formait. Cette
matière grasse avait déjà perdu la propriété de se
fondre au feu.

Le 19. il s'est formé au fond de l'eau que
j'avais transféré un dépôt blanc uniforme semblable
à celui qui se forme au fond de la limphe exposée à la
pourriture, et se couvrait d'un rouge.
Je sténis de nouvelle eau les vaisseaux de
peau le 22.

La peau jettée la ligne. L'écaille de la peau
était à peu près devenue que les jours précédents, mais
les vides sont plus pénétrants, même une partie, et
elle rougit un peu la peau bleue. Elle est jaun
et une partie même peau est blanche fétide.
Le sang est devenu plus fétide.

Le 4^e août j'ai senti dans un troisième vase
la levure qui j'avais mis sur la peau, elle est
blanchâtre; avec une odeur fétide. Elle est l'égale
et rougit un peu la peau bleue. Elle
ressemble quatre jours après un premier j'ai
senté la première, elle sent aussi une partie
de son activité.

En un second degré j'ai senti un peu
selon une odeur moite. Il rougit un peu
peu et j'ai vu peu. La même odeur est
toujours, et rougit un peu que la première
et j'ai vu bleu.

Il paraît que dans cette apparence la levure a
été naturel à la peau ainsi que la levure
est une fois que se développe dans la première
fermentation, mais que par la suite il est dégagé
au moyen de la putréfaction des alkalis volatils
qui ont une partie de cet acide.

La levure qui est formée au dessus de la graisse
et qui avait après la nature des matières
stomatiques, indiqueraient être la formation
de ces substances dans l'estomac.



12.

un homme âgé de 70 ans mourut d'une
hémie intestinale étranglée, à l'ouverture du cadavre les
intestins étoient enflammés et la portion étranglée étoit
gangrénée. Il y avoit plus de la moitié des intestins
grêles remplis d'une matière grasse grassement et assez
fêlée semblable à du jaune d'œuf durci et serré.
Le reste de la matière étoit celle du petit lait. Elle
s'oxydosoient le papier bleu. Le gros intestin étoit
chargé de matières blanches fêlées - peu glutineuses.

13.

un homme âgé de 40 ans mourut d'une
inflammation de bas ventre à la suite d'une indigestion.
Les intestins grêles furent trouvés remplis d'une
matière liquide et blanche semblable à de la bouillie
claire, et jaunâtre à celle qu'il avoit bue pendant la
maladie. Cette matière étoit un peu en haut que
pas en bas. Elle s'oxydosoient la couleur de
tournefol et verdisssoient celle de violettes, il y avoit
dans les gros intestins quelques ~~matières~~ masses
d'une couleur friable et d'un blanc jaunâtre, qui
produisoient les mêmes effets sur les teintures. Il y avoit
dans l'estomac des semblables matières que dans les
intestins grêles, mais elles étoient profondément avec
les boyaux que le malade avoit pris.

J'exposai ces matières dans un vase sur le feu
avec le but de voir si elles se souleveroient à la manière
du lait, et formeroient beaucoup de mousse après avoir
bouilli, mais ne se soulevèrent point, une
separation qu'on devoit de la vaporisation qui
étoit faite.

Je mis une autre portion de la matière dans une bouteille, elle subit tout peu également la propriété de l'acide le plus bleu. au bout de huit jours il se forma à la surface une croûte blanche et jaunâtre qui ressembloit à de la cendre.

Le résidu restant étoit fort épais, je le mis sur les charbons, la plus grande partie liquéfia comme les précédentes, et étoit la plus; la petite partie se réduisit en un charbon qui étoit blanc comme la cendre. Le liquide qui étoit dans la bouteille étoit clair et verdâtre, n'avoit acquis une opacité qui tenoit du laïgue, je l'avis sur le feu le gonflement, bouillie subite, elle perdit la fluidité, et reprit la première aigreur.

La même melle avec parties égales de vinaigre, il ne s'en fit point de fermentation, mais il se forma des grumeaux blancs, pour les uns alloués au fond, et les autres nageoient dans le liquide.

Je ne fais de l'alcali fixe sur une autre partie de cette ~~liquide~~ matière, elle se gonfloit et formoit la même croûte.

Il paroit que dans ces deux dernières observations les matières alimentaires étoient restées chargées tout le chile qu'elle contenoient, qui après avoir été préparé dans les intestins n'avoient pu passer par les vaisseaux lactés. D'autant que les propriétés qu'avoient ces matières sont à peu près celles du chile. et les ~~propres~~ phénomènes qu'on voit dans ces matières non délayées n'ont pu donner un indice des degrés d'altération dont elles étoient susceptibles.



727

un homme âgé de 45 ans se fit une piqûre
avec la pointe des ciseaux sur le milieu du nez.
Il en résulta un pus qui fut suivi d'un bon de quelques jours.
S'en suivit la cicatrice, avec un gonflement considérable
sur la partie inférieure du nez.

~~Il y eut une suppuration~~

Le pus et les cataplasmes eurent d'abord
un peu de succès. D'abord on calva le nez avec du linge
mais après être resté pendant la nuit, il s'écroula
la partie inférieure du nez devint avec un gonflement
grande et mille de quelques lancettes, la suppuration
était toujours en petite quantité et de peu de durée.
elle rougea le papier bleu.

Les cataplasmes et les bains furent supprimés
le gonflement disparut les chairs reprirent leur action
et la suppuration devint plus abondante et plus
épaisse, alors il rougea le papier bleu mais plus
faiblement.

Pour le traitement des chairs
deviennes seules, on les lava avec l'eau de l'emplâtre et
la suppuration devint tout à fait louable.
alors elle rougea le papier bleu mais plus
faiblement.



une demoiselle d'un tempérament délié et maigre et
phlegmatique se fit une tumeur sur un morceau de papier
une plaie ouverte d'où sortait un pus et profond d'un
ligue de demi à la partie supérieure de la fosse.

La suppuration qui était d'abord en petit rougea
fortement le papier bleu pour l'enlever des grâces
Les lèvres de la plaie se gonflèrent et se séparèrent.

de l'autre, la suppuration devint mieux abondante et
rougissive d'ailleurs le papier bleu, les douleurs
étaient lancinantes. indigestif de lachon egras
augmenta la suppuration mieux n'en changea point
la nature, et s'améliora point la plaie qui
s'agrandissait, le pus était toujours acide.

Les balsamiques sentirent les chairs vermeilles et
la suppuration louable qui devint alors faiblement
le papier bleu.

Les deux premières observations faites sur des sujets
faibles firent voir le mauvais effet des bains locaux
des balais au se des médicaments gras et huileux
à la fois, et en même temps que le pus louable et
bien en voie et légèrement acide, et que son
acidité augmente lorsqu'il approche mieux du
degré de coction.

un homme d'un tempérament coarcté avec un ulcère
à la jambe. de la grandeur de la main, les chairs
étaient fongueuses molles et infectées, la suppuration était
froide abondante, son mauvais odeur, une
rougissive par le papier bleu, une verdissive point
la teinte de violettes, quelques jours après elle devint
noirâtre et putride, alors elle rendit fortement
la teinte de violettes, quelques jours après le pus
devint louable, alors il devint légèrement la teinte
de tournefort.

Cette observation fait assez voir que le pus dans
les ulcères est sujet aux mêmes altérations que la
lymphe exposée à la putréfaction; la lympe dans
son état naturel n'attire point les couleurs blanches de
végétal, nous plus quelques jours qui n'ont encore passé
aucune lecture, les sauts des hidropiques qui ont souffert.

une première formation dans le tissu cellulaire ou ille
pour l'enfermer. Devenant acide. Lors quela
putrefaction s'en empare l'alkali volatil s'exale
pour se rendre en fuite lors qu'on les expose au feu.
comme dans les ulcres, le pus alkali quil
est devenu par la pourriture, ou de trop acide apres
un commencement de formation. Sans pourrir
la lésion; l'ancien acide s'excuse quand les chairs
sont sechées sous le pus procurent ala lésion
matière de pus, le degré de lésion commuable.
dans les ulcres putrides.



une femme atteinte de la maladie nerveuse en
d'un tempérament lachémique, avoit une tumeur sur
la ~~poitrine~~ qui l'avoit enflammée. La tumeur s'agrandit
et devint par la suite très tendue et
atteinte par le pus. Les saignées liquides, il survint
un bon pus fluide dans son tissu cellulaire de
l'environ qui s'enflamma. Les bords de l'ulcère le
tissu s'enflamma et tomba en pourriture avec le tissu
cellulaire qui étoit bon jusque là, alors un ganglion
humide; une escharre s'en forma, sous l'autre. La
matière ichoreuse et putride qui s'écouloit étoit
fort puante, elle s'écouloit et s'écouloit par
la tumeur de viscéralité, la femme mourut quelques
jours apres.

177.

un adulte d'un tempérament lachémique avoit des tumeurs
suppuratives aux bras et aux jambes, qui s'enflammaient
et se couvraient de pus apres. Il se leva au dessus du
niveau de la peau des chairs rouges, rouges et
livides. La peau se détacha du tissu cellulaire de

environ qui en pénétrant de sang se changea en une
 substance spongieuse livide qui la pénétra fort en
 dedans. après que cette piece fut débridée sans enlever
 rien bon pour donner plus d'aisance au tissu cellulaire
 qui se détacha aisément avec le doigt, il fut baigné
 au bain de quelque jours une suppuration putride
 se filant en ~~peu~~ d'un blanc jaunâtre, et le malade
 se il se détacha des eschares gangreneuses d'une
 couleur qui n'est brune que longtemps après.
 Cette suppuration s'ouvrit un peu de temps
 plus en recouvrant la tumeur de violettes.

3.

un vieillard âgé de 64 ans d'un tempérament
 phlegmatique et cacochyme avoit un cancer au
 sein. Les bords devinrent durs, blancs et
 universels. Le cancer prit une apparence
 carcinomateuse. Les chairs étoient brunes et
 fétides, la suppuration feroit blanche et
 grumeleuse. il se forma ensuite des eschares
 gangreneuses blanchâtres qui se succéderent les unes
 aux autres, d'autres s'élevèrent au-dessus de la peau et
 s'ouvrirent. Le cancer prit une apparence
 de tumeur blanche et putride qui en
 sortoit toujours en rouge le papier bleu se recouvrit
 la tumeur de violettes.

La gangrene se forma au bout de quelques jours
 environnant les apophyses de Kienkin, et des tumeurs
 avec les mêmes apophyses.

4.

un homme âgé de 40 à 45 ans d'un tempérament
 cacochyme au sein d'un cancer vénérien
 dans le sein, qui étoit gros comme la tête d'un enfant
 de six ans. Le cancer s'ouvrit et les os du
 sein internes qui s'écroulèrent; longtemps après il parut

plusieurs points froids, infiltrés de bon lait
qui était fait. Elle se / Kirraup sans beaucoup de
douleur; elle s'ouvrit au bout de quelques jours par la
partie la plus saillante, il se forma une escharre
gangreneuse qui après l'achève se prit mieux beaucoup
de glandes engorgées et tremblées d'une substance
fongueuse et rouge semblable à du sang coagulé.

L'intérieur de tout le bubon tomba aussi en
gangrene, et la tumeur s'affaissa par la partie de
la paroi postérieure putride, noire et fétide. Ces
matières se rongissaient comme la tumeur de tout le
côté mais sans former de cicatrice.

Le gangrene fut bornée à la tumeur et la malade
est guérie.

5.



une fille âgée de 22 ans atteinte de la maladie vénérienne
eut un engorgement des glandes parotides droites, et
dans toute la tumeur cellulaire qui les environne, les muscles
de la tête et de la nuque brisés, que dans l'autre côté
entraîna la bouche du côté gauche. Longtemps après
la tumeur cellulaire engorgée tomba en gangrene, et se
sépara des parties vivantes sous la forme d'escharres
noires, blanches et fétides, il en sortit des matières
blanches et jaunâtres, qui avaient la propriété de
rougir au feu le papier blanc et de verdoyer la
teinture de violettes.

6

un homme de 24 à 25 ans d'un tempérament molle
coarcté, et d'un air leucémique, en l'avant bras
fracturé d'un bras, de faible. quelques jours après il
survint un gonflement très considérable de la partie

La fièvre salubre et la suppuration qui devient bonne et
laquiescente en putride, ne rougissent point la
papier blanc mais verdissent fortement la teinture
de violette.

cinq à six jours après la fièvre cesse et les accidens
de la leucémie, alors la suppuration qui redevient
bonne commence un peu à rougir la teinture de
tournefol.

ensuite que les matières redeviennent bonnes,
j'observai qu'elles rougissent davantage la teinture
de tournefol et verdissent moins celle de
violette.

un homme âgé de 60 ans, d'un tempérament sanguin
 mais détruit par les différentes maladies nouvelles,
 qu'il avoit eues, avoit depuis quelque temps un
 bubon suppuré, le pus des environs parvenoit
 au fœtus boubon, mais la suppuration des glandes
 situées qui s'écouloient par le dit. peu de
 jours après que les glandes furent scindées, les
 environs devinrent tendus et douloureux, et l'écoulement
 de la suppuration fût si. Les environs furent
 particulièrement après application de cataplasmes
 liquides. Le pus se forma, il se leva des eschares
 jaunâtres qui se firent place les uns sur autres
 les uns s'élevèrent et se firent sans s'écarter
 plus profond, les vaisseaux s'ouvrirent
 de nouveau, et il survint des hémorragies considérables.
 La gangrène parut le 6^e jour pour quelques jours
 mais surtout les bords de l'ulcère étoient devenus
 douloureux, et se firent de nouveaux. Le 10^e jour, le
 fond blanchâtre s'agrandit, il se forma de
 nouvelles eschares, semblables aux premières
 qui se firent. Le 12^e jour, l'ulcère devint
 plus grand, quoique grand, de bonne nature, et
 sans la suite au malade.

Donnâtes du progrès de la gangrène la
 suppuration putride qui en sortoit étoit fort puante
 long, puis légère en la papier bleu et se dissipa
 beaucoup la teinte de violet. mais à mesure
 qu'elle devenoit plus blanche et plus épaisse,
 quoique fœtide elle avoit une odeur d'ail et d'ail
 d'avantage le papier bleu, se verdissait moins
 la teinte de violet.



Resultat de les observations c'est qu'il paroit
que le pus est toujours d'un acide, et qu'il contient
quelqu'alcali volatil. Lorsque qu'il est bien lui en bien
conditionné; et que fuisse qu'il s'éloigne de son état
soit du côté de la crétité soit du côté de la pourriture
les uns ou les autres de ces fels est cadent, et qu'il varie
dans les propriétés.

vous avons vu dans les premières observations que
le pus qui manquoit de l'action pour avoir subi aucune
fermentation, avoit les mêmes propriétés que le pus ^{opile}
du sang, c'est à dire qu'il ne bouillissoit point le papier bleu
et n'alteroit pas la teinture de violettes, que lorsqu'il avoit
subi un commencement de fermentation et s'éloignoit
dans des chaires molles et sans action, l'acide domine
alors et qu'il bouillissoit davantage le papier bleu que
celui qui étoit bien lui. Ces dernières observations
qui pourroient être plus multipliées, viennent encore
à l'appui de ce que nous avons déjà vu que plus le
pus s'éloignoit de la véritable action de la crétité de la
pourriture les alkalis volatils deviennent plus manifestes,
monfieur pringle ne l'apprendant pas observe la même chose
dans les affais qu'il a fait sur la pourriture, mais il
parroit qu'il n'a pas vu tous les mêmes possibles
pour ces affais.

vous voyez encore que si l'on se feroit l'application
la nature du pus est différente. entre la gangrene
sèche et la gangrene humide qu'on trouve
communément on pourroit encore distinguer dans
l'humide, la noire et la blanche; c'est à dire celle
qui accompagnée de lividité endommageant dans
la partie putréfiée l'écoulement du pus dans les
foies contigus les escarres des parties
molles, et lors que des phlegmes ou ~~un grand~~ de
parties sont engorgées de sang tombent en pourriture
et don. les matiers pour noires ou blanches et putrides.

(33)
la blanche. Elle est caractérisée par des escharres
blanchâtres jaunâtres et filandreuses. Elle a une ma-
tière ou substance ou blanche ou blanche et rouge, ou bien
degrés de ~~matière~~ dans l'utérus, l'ovaire,
survient presque toujours aux parties engorgées -
d'une lymphes épaissies, et qui semble particulièrement
au cancer, et aux ulcères, cancéreux et carcinomateux.

Dans la première espèce de végétation nous
avons vu que le Kali volatil devint absolument
et que les matières ne faisaient aucune impression
sur le papier bleu ordinaire et ne le rendaient pas
bleu. La teinture de violettes, et qu'on contraind dans la
seconde elle s'engraisait fortement le papier bleu
et ne le rendait pas moins que dans les précédentes la
teinture de violettes.

En premier lieu la plus laiteuse

Le premier cas d'une abesse au sein d'une femme
nouvellement accouchée, qui avait la galle selon
un aladin vénérien, et qui était très engrais-
sée le papier bleu. On peut s'attendre à former
par l'engraisement pendant la grossesse.

Une autre femme si grosse et accouchée avait un
dépôt au sein formé par l'engraisement, le plus
étendu, et s'engraisait le papier bleu, mais
s'engraisait fortement que le précédent.

3.

Le 12 juillet 1842 j'ai vu du papier fort d'un dépôt
formé par l'engraisement au sein d'une femme qui avait la
galle selon la maladie vénérienne, mais qui était si grosse
et nouvelle accouchée le papier était très lisse, sans blanc ou
sans dépôt au sein, mais comme d'habitude qu'on a l'habitude



acquiré, et s'enferme dans le petit ton blanc qui après
avoir été lavé avec l'eau apparemment que de
debris de Nasse cellulaire. Les matières sangifères
fortement le papier ~~bleu~~ j'en fis bouillir une
partie qui ne s'écoula point mais qui se dissipait
à la manière d'une bouillie, à mesure que
l'évaporation se faisait. il se forma ensuite à sa
surface une pellicule jaunâtre qui se semblait
de la graisse. elle couvrit le papier après cette
opération aussi fortement qu'auparavant.

Je conservai l'autre partie qui n'avait
point été au feu pendant un mois dans un vaisseau
de bouché, elle acquit une odeur fétide et forte, mais
sans cesse laigre, elle s'évapora fortement
le papier bleu, se vendit un peu l'écume de
violette. Je la fis ensuite bouillir, et j'en les-
sai de l'écume qui se laissa voir.

Sur le pus sanguinolent.

1.

Le pus sanguinolent que fournissait un ulcère
profond à la fesse d'un homme qui avait la galle
ne s'évapora point le papier bleu, se vendit
pas d'écume de la teinte de viollette.

2.

Le pus sanguinolent se glaçant qui sortoit d'un
peu d'ulcères vénéreux et abscessés, ne donna
aucune marque d'acidité ni d'alkalinité.

ces observations peuvent servir à faire voir
que l'acidité observée dans les matières de l'observation
précédente provenoit plutôt d'une nature
particulière que de la décomposition vénéreuse
ou putride, comme on pourroit le croire.

Dans le commencement d'août de septembre 1772
 j'ai pris de pur fortune un obéi par la Gazette au
 d'effus d'agrandir d'un homme qui avait une foule
 au kilob. venant, et qui ne paraissait pas
 avoir aucun que dans la tentation. Le malade souffrait
 beaucoup et avait de la fièvre depuis quelque temps; les matières
 étaient filandreuses, grêlées, larges, volantes, avec
 quelques grumeaux, les matières semblables, et depuis
 d'être en état de se faire, elle ne faisait pas d'impression sur
 la tentation. De tourment et de vertige, elle de violettes

J'ai si fait bouillir une partie qui s'est évaporée
 au point presque entièrement, et j'ai bu l'autre dans
 une phiole bien bouchée pendant un mois. au bout de
 quelques jours il survint un peu de la même rougeur
 que j'étais parvenu à que j'étais parvenu à feu, elle se
 évapora dans la chambre. quand elle est éteinte dans
 la phiole il n'est arrivé aucune changement pendant tout
 le temps que j'y ai gardé. j'ai abandonné mon expérience
 à cette époque.

Le regard du dépôt, au point qu'il fut ouvert, les
 accidents augmentèrent. Les matières devinrent putrides et
 fort puantes; et les douleurs augmentèrent. Le malade
 mourut au bout d'un mois, le dépôt fut trouvé à l'ouverture
 de la tentation.

Les quelques matières devinrent putrides et jaunâtres
 elles blanchirent la tentation de tourment et de
 vertige et de violettes.



sur les matières stéatomateuses
ou celles de lath. oue.

une femme âgée avoit depuis longtemps des
tumeurs en différentes parties du Corps, les unes
situées sur les os, les autres enfoncées dans les parties
charnues et grasses. Celles qui étoient situées sur
les os se faisoient sous la substance, Celles qui
étoient dans des parties charnues s'étendoient peu
à peu sur les muscles et pénétraient dans leurs
corps, toutes ces tumeurs étoient en fistules, l'en-
veloppement étoit dur et stéatomateux, le Centre
au contraire étoit mol, se ressembloit à de la cervelle
ou tenoit de la nature de lath. oue. Dans d'autres
il y avoit au Centre des Caillots de sang noir en
partie dissout.

Les matières qui étoient de nature stéatomateuse
rougissoient le papier bleu assez fortement, celles du
Centre qui apprennent de lath. oue. le rougissent
aussi mais plus faiblement. Les Caillots de sang
qui se trouvoient dans certaines n'étoient aucune-
ment résineux, aucune de ces matières n'avoient
devenues excepté la partie du lath. oue.

un cadavre avoit toutes les glandes du mesenterium
reformées qu'on stéatomateux du poids de quatre livres,
une autre tumeur de même nature le long des
vertèbres lombaires du poids de trois livres.
L'extérieur de ces tumeurs étoit stéatomateux, l'intérieur
formoit une substance molle et blanche à demi
liquéfiée. et il y avoit dans le Centre quelques foyers
semblables à du sang en partie dissout et en partie
caglié.

les matieres qui estoient veritablement testu matieres
longissimes fortentement le papier bleu, celles qui estoient
quelques liquides le longissimes plus fortentement
encore: et les sanguines ne le longissimes qu'un peu du
tout.

3

un homme d'un temperament d'acrimonie et d'atropie du
malheurien depuis longtems avec une fistule
une fistule qui estoit abonde laite appercevoir
un abces testu matieres qui se proutoient douloureux
douloureux, qui estoient excaver a plusieurs loges le
bon du doigt. l'enfoncement etoit profond de trois
lieues. apres l'ouverture de la fistule l'extremite
des environs se gonflerent et ne se detendirent qu'après
que la suppuration fust devenue abondante blanche
sans partie dure. il sortit aussi des matieres
suspenses de la fistule de l'os.

Toutes ces matieres longissimes finissent le
papier bleu.

4



Le 20 juillet 1778 j'ai vu le cadavre d'une
femme atteinte depuis longtems de la maladie venerique
elle estoit pleine de douloureux considerables dans la
region des lombes.

la troisieme et la quatrieme vertebres estoient
deja tres enarries par un abces enriste qui estoit
forme de chaque cote dans le corps même des
os, et qui s'avançoit vers le bas qui
traversoit entre les vertebres de ces deux vertebres qui
estoient carrees et emplies de matieres blanches.

(36.)
semblables à celles de ~~l'acier~~, ~~qui ont une apparence~~
~~qui le caractère du stéatome tombé en dissolution~~
j'ai vu ~~des~~ pour qui étoient encore chaud dans un
vaisseau sans être bouillies. au bout de deux heures
il nageoit par dessus une bonté limpide qui le
lendemain devint blanchâtre après une consistance
glaiseuse. elle perdissoit ^{peu} la teinte de violette et
ne faisoit éprouver aucun changement à celle de
tournefol. Je fis bouillir toutes ces matières, qui
formèrent un coagulum au fond du vaisseau, à
l'exception d'un peu de la vingtième partie.

Le coagulum et le liq. qui restoit verdirent
moins la teinte de violette moins qu'avant d'avoir
suffert l'ébullition. et bouillirent légèrement
celle de tournefol.

Il y a apparence que ce dépôt dans le principe
étoit un stéatome, et qu'il attaquoit tout à la fois la
substance des muscles, des os et celle des vertèbres
lombaires, c'est-à-dire ce qu'on appelle la manœuvre lente
avec laquelle il s'est formé. j'ai vu dans les mêmes
parties d'autres dépôts semblables dont on ne pouvoit
pas douter de la nature primitive parce que les
matières n'étoient pas encore tombées en dissolution.

Il paroit que les fortes de matières se fermentent
dans le corps sous l'inspiration de deux fortes de
dissolution. la première est une dissolution spontanée
sans le concours d'aucun agent extérieur et qui n'est qu'une
putride, les matières se ramolissent seulement sans
la fermentation bouillie qui les empêche de devenir
semblables à celles de l'athérome. Suivant le
degré de fermentation l'acide se manifeste plus
ou moins dans les matières mais ordinairement
d'avantage qu'avant leur dissolution, quoique
cependant j'en ai quelquefois vu le contraire mais

L'autre espèce de disposition se fait par le concours de lais extérieur qui détermine une prompte fermentation qui est bientôt suivie de la putrefaction. il est certain que si on ouvre une tumeur de cette nature la gangrene se déclare le lendemain, et les matières qui en sortiront seront très viciées, surtout si la tumeur est fort considérable et profonde. Je ne parle pas des petites tumeurs enkistées qui se rencontrent quelquefois sous la peau.

Ces matières viciées manifestent ou un acide ou un alkali dominant suivant le degré de la putréfaction.

Expérience faite à la guadeloupe

sur la perotide du sang



Le six mai j'ai vu de la perotide du sang que je venois de tirer d'un sang qui se ne pourroit pas infecter d'aucun vice. Je le pressai au soleil dans une phiole bien bouchée. La perotide étoit un peu rougeâtre, le lendemain au soir je trouvois le liq. devenu clair, les globules sanguins étoient déposés dans le fond sous la forme d'un poudre rougeâtre. Les choses demeurèrent dans cet état les trois jours suivants, et le sang étoit devenu fétide et pénétrant. Le quatrième jour le liq. redevenu rougeâtre et boueux, elle resta deux jours dans cet état, son odeur étoit encore plus forte, je la laissai débouche, le lendemain elle étoit éclaircie, et étoit devenue verteâtre, il se déposa un peu de sédiment de couleur gris mais en petite quantité je la laissai encore quatre à cinq jours débouche et

en plein air, alors elle ne dure pas très longtemps, mais
son odeur pénétrante s'élève en partie, et elle
contracte un peu d'air.

On voit que les résultats sont à peu près
les mêmes qu'en France excepté que la température
à l'Amérique paraît contenir moins de parties
susceptibles de former le sébum blanc que nous en
avons de nous-mêmes et on a vu la réaction du jour.

J'ai encore vu quelquefois remarquer
à l'Amérique un air de voir quelque chose d'effrayant
de plus que j'ai eu jusqu'à présent occasion
d'observer.